

Associazione Donatori Volontari Ospedalieri Sangue Salerno	<i>Unità Operativa</i> Unità di Raccolta VOSS SISTEMA QUALITÀ	
MODULO – UR.MOD 17.016		
Criteri di sospensione del donatore per assunzione di farmaci		Ed. 1 del 28.02.2024
<i>documento a scopo di consultazione per donatori</i>		Rev. 1 del 28.02.2024

Farmaci	
Assunzione di farmaci	<p>Rinvio per un periodo variabile di tempo secondo il principio attivo dei medicinali prescritti, la farmacocinetica e la malattia oggetto di cura.</p> <p>Per i soggetti che assumono farmaci a dimostrato effetto teratogeno, la sospensione dovrebbe essere protratta per un periodo adeguato in rapporto alle proprietà farmacocinetiche del farmaco stesso.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antiaritmici 	<p>Esclusione finchè perdurano le condizioni che ne determinano o ne hanno determinato l'assunzione.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antibiotici ▪ Antimicotici 	<p>Esclusione per 7 giorni dal termine della terapia (previa valutazione medica).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antibiotici per uso topico ▪ Antimicotici per uso topico 	<p>Idoneità</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspirina ▪ Antiaggreganti piastrinici 	<p>✓ In caso di assunzione saltuaria negli ultimi 7 giorni = idoneità alla donazione di sangue intero, ma non utilizzare per la produzione di piastrine e inviare il plasma al frazionamento.</p> <p>✓ In caso di assunzione continuativa come terapia per malattie cardiovascolari = esclusione</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antinfiammatori 	<p>Esclusione per 5 giorni dall'ultima assunzione.</p> <p>In caso di donazione di piastrine, esclusione temporanea dalla donazione per 7 giorni dal termine della terapia.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antipertensivi 	<p>Valutazione caso per caso, con particolare attenzione al quadro clinico del donatore.</p> <p>Alla prima donazione, un donatore in terapia con β-bloccanti può essere ammesso alla donazione in caso di sospensione del farmaco.</p> <p>I donatori abituali, già in trattamento cronico con beta-bloccanti, che non hanno mai avuto reazioni, possono essere considerati idonei.</p> <p>L'assunzione di β-bloccanti e/o di ACE-inibitori configura controindicazione assoluta alle procedure in aferesi.</p> <p>Esclusione in caso di associazione farmacologica.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cortisonici 	<p>✓ Idoneità se per uso topico</p> <p>✓ Se terapia sistemica, esclusione per 15 giorni dal termine della terapia.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acitetrina (ad es. Neotigason) 	<p>Esclusione per 1 anno dall'ultima assunzione.</p>

Associazione Donatori Volontari Ospedalieri Sangue Salerno	<p style="text-align: center;"><i>Unità Operativa</i> Unità di Raccolta VOSS SISTEMA QUALITÀ</p>	
MODULO – UR.MOD 17.016		
Criteri di sospensione del donatore per assunzione di farmaci		Ed. 1 del 28.02.2024
<i>documento a scopo di consultazione per donatori</i>		Rev. 1 del 28.02.2024

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finasteride (ad es. Prostate) 	Esclusione per 2 mesi dall'ultima assunzione.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Roaccutane) isotretinoina - per terapia anti acne - 	Sospensione per 1 mese dopo la fine del trattamento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dermatologici: <ul style="list-style-type: none"> ✓ (Tigason) etretinato ✓ Antimetaboliti ✓ Ciclosporina (psoriasi) 	Esclusione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antistaminici 	Idoneità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contraccettivi ormonali sistemici 	Idoneità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Eutirox) Tiroxina 	Esclusione solo in caso di tiroiditi o in seguito a neoplasie
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terapia con estratti della ghiandola pituitaria (ormoni della crescita) 	Esclusione permanente (Vedi "TSE").
<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Tapazole) Metimazolo 	Esclusione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vasodilatatori arteriosi 	Valutazione medica
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sedativi ▪ Antidepressivi 	Idoneità (se assunzione saltuaria fino a 20 gocce di benzodiazepine.) Quantità maggiori di ansiolitici e soprattutto l'assunzione di antidepressivi devono indurre alla sospensione anche definitiva in base alla patologia
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anoressizzanti 	Sospensione temporanea per un mese dalla fine del trattamento
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ipocolesterolemici 	Idoneità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antispastici 	7 giorni di sospensione e valutazione in base alla patologia
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antiacidi 	Idoneità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anabolizzanti 	Esclusione
Assunzione non prescritta di sostanze farmacologiche	Sono esclusi i soggetti con uso attuale o pregresso non prescritto di sostanze farmacologiche o principi attivi, comprese sostanze stupefacenti, steroidi o ormoni a scopo di attività sportive, per via IM, EV o tramite altri strumenti in grado di trasmettere malattie infettive. Sostanze stupefacenti assunte per altre vie: Il soggetto può essere ammesso alla donazione se uso sporadico e non recente, e dopo approfondito colloquio con il medico.